



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**
(Минздрав ЧР)

ул. им. Чехова, 4, г. Грозный,
Чеченская Республика, 364051;
тел./факс: (8712) 22-20-51, 22-38-13;
e-mail: info@minzdravchr.ru;
<http://www.mzchr.ru>

**НОХЧИЙ РЕСПУБЛИКИН
МОГАШАЛЛА
ІАЛАШИАРАН
МИНИСТЕРСТВО**

Чеховн царах урам, 4, Сөлжя-Гала,
Нохчий Республика, 364051;
тел./факс: (8712) 22-20-51, 22-38-13;
e-mail: info@minzdravchr.ru;
<http://www.mzchr.ru>

10.10.2022 № 6922
На № _____ от _____

Руководителям медицинских
организаций
Чеченской Республики

Министерство здравоохранения Чеченской Республики сообщает, что теперь любым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) можно будет привиться как внутримышечно, так и интраназально.

Интраназальное введение вакцины формирует специфический иммунный ответ к коронавирусной инфекции всего организма, в том числе локально на слизистой оболочке дыхательных путей, создает иммунитет во входных воротах и запускает факторы местного иммунитета, то есть блокирует вирус на путях проникновения в организм. В то же время обеспечивается и гуморальный (количество антител) иммунитет, вырабатываются антитела.

Взрослым можно одновременно привиться от гриппа и коронавируса, возможно введение в пределах одного календарного дня гриппозных вакцин и вакцин «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V), «Спутник Лайт», в том числе интраназальное введение «Гам-Ковид-Вак». Это распространяется на введение каждого компонента. Напомним, при иммунизации от ковида и гриппа в разное время необходимо соблюдать интервал не менее месяца между введениями вакцин. Решение об интраназальном введении вакцины принимает медицинский работник на основании состояния здоровья и желания пациента.

При интраназальном способе введения вакцину вводят при помощи дозирующего устройства (насадка-распылитель на шприц вертикального типа для назального применения лекарственных средств), в один носовой вход на вдохе. Перед введением препарата попросить пациента высморкаться, проверить проходимость носовых ходов поочередно закрывая один носовой ход и делая несколько вдохов. Набрать в шприц всё содержимое флакона, снять иглу, надеть на шприц дозирующее устройство, поршень оттянуть для создания воздушного

пузыря примерно 0,5 мл и резким нажатием на поршень шприца ввести препарат пациенту в один носовой ход на вдохе, закрывая пальцем другой носовой ход.

Мелкие капли орошают слизистую оболочку носа, избыток препарата стекает по задней стенке глотки. Наблюдать за пациентом в течение 30 минут после проведения вакцинации, чтобы вовремя выявить постvakцинальные реакции и осложнения и оказать экстренную медицинскую помощь. Рекомендовать пациенту в течение 2-х часов воздержаться от чихания и высмаркивания, а также исключить курение, прием пищи и жидкости.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель министра

П.А. Фадеев